

Ce trebuie sa stii, ce trebuie sa faci

Hipoglicemie poate aparea chiar si atunci cand respecti intocmai indicatiile medicului. Cu toate ca scaderea glicemiei nu poate fi prevenita intotdeauna, aceasta poate fi trataata inainte ca situatia sa se agraveze.

Simptome frecvente ale hipoglicemiei:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> transpiratii reci<input type="radio"/> tremuraturi<input type="radio"/> senzatie de foame accentuata<input type="radio"/> nervozitate<input type="radio"/> anxietate | <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> slabiciune, moleseala<input type="radio"/> stare de confuzie<input type="radio"/> scaderea capacitatii de concentrare<input type="radio"/> somnolenta<input type="radio"/> ameteala |
|--|---|

5 masuri de prim ajutor pentru a echilibra glicemia

Daca ai simptomele de mai sus iar glucometrul indica o valoare sub 70 mg/dl, urmeaza acesti pasi pentru a aduce la un nivel normal glucoza din sange:

- 1.** Consuma, la alegere, **una din aceste variante de dulce** care insumeaza **15 grame de carbohidrati** cu actiune rapida:
 - 3-4 patratele de glucoza
 - 2 lingurite cu stafide
 - o lingurita de zahar sau miere
 - o jumata de pahar cu suc de fructe sau suc carbogazoas indulcit cu zahar (nu dietetic)
 - un pahar cu lapte degresat sau cu 1% grasime
 - 4-6 bomboane dulci, dropsuri sau jeleuri
- 2.** Asteapta 15 minute si masoara-ti din nou glicemia.
- 3.** Daca glicemia este tot sub 70 mg/dl sau te simti la fel de rau, consuma iar ceva dulce si dupa 15 minute verifica-ti din nou glicemia. Repeta procedura pana cand glicemia este mai mare de 70mg/dl.
- 4.** Daca urmatoarea masa este programata peste mai mult de o ora, mananca o gustare inainte, dar numai daca glicemia a ajuns peste 70 mg/dl.
- 5.** Contacteaza-ti medicul daca te simti rau in continuare, iar glicemia ramane scazuta, sub 70 mg/dl, sau daca episoadele de hipoglicemie se repeta de mai multe ori intr-o saptamana.

Injectia cu glucagon, solutia salvatoare in crizele acute de hipoglicemie

In lipsa unui tratament rapid si adevarat, simptomele hipoglicemiei se pot agrava in mai putin de o ora si pot duce la aparitia comei hipoglicemice.

Simptomele comei hipoglicemice:

- pierderea constientei
- greata
- convulsiile
- transpiratia abundenta
- cefalee

Tratamentul de urgență necesar în cazul instalării comei hipoglicemie constă în injectii cu glucagon – un hormon implicat în reglarea echilibrului glicemic, alături de insulina.

Informatii importante despre injectiile cu glucagon:

- Se prescriu doar de către medic și se administrează strict conform indicațiilor acestuia.
- Dacă suferi frecvent de crize de hipoglicemie, tine la indemana acestei injectii.
- Persoanele apropiate trebuie instruite să folosească aceste injectii și care sunt simptomele comei hipoglicemice, astfel încât să poată interveni rapid dacă iti pierzi constienta. Dacă nu stiu cum se administrează, este necesara apelarea numărului de urgență 112 pentru intervenție medicală promptă.
- Dacă starea de constientă nu revine la 30 de minute de la administrarea injectiei cu glucagon, este necesara transportarea de urgență la spital deoarece se poate instala coma hipoglicemică prelungită, cu efecte severe la nivel cerebral.

Surse: Asociația Americana de Diabet (diabetes.org) și din materialul de educatie al Roche Diabetes Care Romania.

